

O.51 - Relato clínico de dois tipos de tratamento para mancha branca em dente anterior

Marti LM, Santos SCC, Turrioni APS, Fragelli CMB, Pansani CA

lu_mmarti@yahoo.com.br

A hipoplasia do esmalte resulta em lesões caracterizadas por manchas brancas locais ou generalizadas, as quais prejudicam a estética por destoarem do aspecto natural do esmalte dental. As alternativas de tratamento variam desde tratamentos menos invasivos como a microabrasão, associada ou não ao clareamento dental, à facetas de resina ou coroas. O presente trabalho relata o caso clínico de uma criança de 9 anos de idade, que chegou a clínica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Araraquara apresentando mancha branca sugestiva de hipoplasia do esmalte no elemento 11, a qual procurou tratamento odontológico com finalidade estética. Primeiramente, foi realizada uma tentativa de tratamento minimamente invasivo através da técnica de microabrasão com ácido fosfórico e posterior aplicação de pedra pomes, utilizando instrumento rotatório. Ao detectar ineficiência do tratamento e observando profundidade da lesão branca, optou-se por realizar restauração com resina composta. Ao final do tratamento, paciente e responsável mostraram-se satisfeitos com os resultados estéticos alcançados.

Palavras-chave: *Hipoplasia do esmalte dentário; microabrasão do esmalte; resinas compostas.*