

O.53 - Abordagem cirúrgica de hemangioma intraoral

Madeira MFC, Cardoso CL, Fernandes LMPSR, Gonçalves ES, Ferreira Júnior O

maria.madeira@usp.br

Hemangiomas são malformações vasculares ou neoplasmas benignos que se caracterizam por proliferação de vasos sanguíneos. Paciente leucoderma, 15 anos, sexo masculino, procurou o serviço de Estomatologia da FOB-USP com queixa de “carne crescida” na bochecha. Ao exame físico, foi observada uma lesão nodular avermelhada, de aspecto moriforme, 2 cm de diâmetro, resiliente à palpação, assintomática e localizada em mucosa jugal, do lado direito. Na história da doença atual, o paciente havia traumatizado o lado direito da face durante um jogo de futebol e desde então a lesão apareceu e cresceu num período de 1 ano. O paciente relatou incômodo ao mastigar e hábito de morder a lesão. O diagnóstico presuntivo foi de hemangioma. A manobra de diascopia foi realizada e não houve alteração de cor da lesão. Considerando o aspecto circunscrito da lesão e condições sistêmicas normais do paciente, optou-se pela excisão cirúrgica da lesão. A lesão foi removida completamente e o tecido subjacente não estava comprometido. A peça foi encaminhada para análise microscópica e o diagnóstico final foi de hemangioma cavernoso. No presente caso, o trauma foi considerado um dos fatores de sua etiologia. A abordagem cirúrgica foi decorrente do comportamento da lesão e a sua circunscrição, ainda sim manobras foram feitas para prevenir possível hemorragia.

Palavras-chave: *Hemangioma cavernoso; tratamento cirúrgico; hemangioma.*