

Ceratoacantoma: achados clínicos e histológicos

Caliento R, Azenha MR, Lacerda SA*

Rubens.caliento@usp.br

O Ceratoacantoma é uma lesão epitelial proliferativa benigna, de crescimento rápido que afeta, na maioria dos casos, as regiões de maior exposição aos raios ultravioleta, como testa, nariz, lábio inferior, mãos e braços, apresentando ligeira predileção pelo sexo masculino, pessoas leucodermas e de meia idade. Outros fatores etiológicos podem estar relacionados com o seu aparecimento, como tabaco, trauma físico e químico local e imunossupressão. Podem ser divididos em três tipos: lesões múltiplas de origem genética ou familiar; lesão eruptiva generalizada; ou tumor massivo expansivo. Clinicamente apresenta 3 fases bem definidas. O objetivo deste trabalho é apresentar um caso de Ceratoacantoma em lábio inferior com características semelhantes ao carcinoma *in situ* ou ao carcinoma espinocelular. O paciente JSF, sexo masculino, 60 anos, leucodermo, história positiva para Asma, compareceu ao Centro de Atendimento Especializado em Diagnóstico Oral (CAEDO) com queixa de ardência no lábio inferior, e lesão presente há mais de seis meses. Houve suspeita de Carcinoma espinocelular e a biópsia foi indicada. O tratamento cirúrgico foi realizado com a remoção total da lesão e o diagnóstico final foi de Ceratoacantoma. O paciente tem apresentando excelente resultado pós-operatório sem sinais de recidiva no acompanhamento de 3 anos.

Palavras-chave: *Ceratoacantoma; patologia; cirurgia.*