

Manifestações bucais dos Linfomas não-Hodgkin

Tinoco-Araújo JE, Zen-Filho EV, Santos PSS, Coracin FL*

tinocoaraujo@gmail.com

Os linfomas representam de 3 a 4% das doenças malignas em todo o mundo e o grupo dos linfomas não-Hodgkin (LNH) constitui a segunda doença maligna mais comum da orofaringe, representando 2,2% das doenças malignas de cabeça e pescoço e 3,5% das doenças malignas intrabuciais. Com objetivo de mostrar critérios clínicos para o diagnóstico das manifestações bucais dos LNH, realizamos uma revisão de literatura nas bases de dados Pubmed e Scopus. Constatamos que os LNH com maior frequência de manifestações bucais são os linfomas difuso de células B, extranodal da zona marginal do tecido linfóide associado à mucosa (MALT), folicular, de Burkitt, linfoma de células do manto, de células T, extranodal de células T/NK nasal e micose fungóide. Apesar da diversidade de apresentações, pode-se encontrar aumento difuso e indolor do tecido com consistência flutuante ou esponjosa, com ou sem ulceração traumática, mobilidade dentária inexplicada, perda de dentes e parestesia. Os dados da literatura mostram que as manifestações bucais dos LNH tem frequência variável e o conhecimento destes sinais e sintomas é fundamental para o diagnóstico e encaminhamento para tratamento dos LNH.

Palavras-chave: *Linfoma não Hodgkin; manifestações bucais.*