

Influência da bandeleta de Simonart e posição dos incisivos laterais superiores em indivíduos com fissura labiopalatina

Palone MRT, Silva TR, Vargas VPS, Dalben GS*

marcos_palone@hotmail.com

Este trabalho teve por objetivo investigar anomalias dentárias de número do incisivo lateral superior decíduo e permanente de acordo com a presença de bandeleta de Simonart, bem como seu posicionamento no segmento mesial ou distal à fissura alveolar. Foram analisadas radiografias panorâmicas, periapicais e prontuários de 250 indivíduos (idade média 6,04 anos, variação 4 a 8 anos, 95 do gênero feminino e 155 masculino) com fissura labiopalatina unilateral completa. A presença de bandeleta (29,19% da amostra) não influenciou hipodontia do incisivo lateral, tanto na dentadura decídua ($p = 0,206$) como na permanente ($p = 0,453$). Da mesma forma, a presença de uma bandeleta de Simonart não influenciou a implantação do incisivo lateral à mesial ou distal da fissura, tanto na dentadura decídua ($p = 0,222$) como na permanente ($p = 0,511$). O incisivo lateral estava implantado no segmento distal em 94,94% dos casos na dentadura decídua e em 82,82% na dentadura permanente, com associação estatisticamente significativa entre as dentaduras ($p = 0,000$). A presença da bandeleta não influenciou a ocorrência de anomalias dentárias de número e o posicionamento dos incisivos laterais superiores na região da fissura. A região de implantação do incisivo lateral superior decíduo foi associada com a região de implantação do incisivo lateral superior permanente.

Palavras-chave: *Incisivo; fissura labial; fissura palatina.*