

Clareamento dental interno utilizando técnica imediata – relato de caso

Cioffi SS, Bortolatto JF, Corsi CE, Campos EA, Oliveira Junior OB*

binaspi@yahoo.com.br

Como o escurecimento de um ou um grupo de dentes interfere negativamente na aparência do sorriso e há uma valorização dos procedimentos menos invasivos, o clareamento dental representa uma opção importante de tratamento estético. Entre as causas das alterações de cor pós-eruptivas, o traumatismo dental, associado ou não a necrose pulpar, é uma das etiologias mais comumente encontradas. As atuais técnicas de clareamento para dentes tratados endodonticamente empregam como agente oxidativo o peróxido de hidrogênio (PH). O objetivo desta apresentação é descrever a técnica imediata de clareamento de dente não-vital por meio de caso clínico. A paciente M.A.S.C., 32 anos, apresentava o dente 22 com coloração marrom-avermelhada após traumatismo aos 8 anos. Constatada necrose pulpar, a paciente foi submetida a clareamento interno, utilizando-se um gel de PH a 35% que também foi aplicado externamente para obter-se resultados mais satisfatórios. Após duas sessões de tratamento, o elemento escurecido já apresentava coloração adequada. Foi, então, realizada uma sessão de clareamento externo e, após, realizadas correções nas incisais dos dentes anteriores superiores da paciente. Assim, restabeleceu-se a harmonia do sorriso, mostrando-se o clareamento dental interno um método efetivo e simples, apresentando resultados rápidos e satisfatórios.

Palavras-chave: *Clareamento dental; clareamento interno; peróxido de hidrogênio.*