

Hipodontia e hiperdontia dos incisivos laterais superiores decíduos e permanentes em indivíduos com fissura labiopalatina

Vargas VPS, Palone MRT, Dalben GS*

vpsaldas@hotmail.com

O objetivo deste trabalho foi investigar a prevalência de anomalias dentárias de número dos incisivos laterais superiores decíduos e permanentes do lado da fissura em indivíduos com fissura labiopalatina. Foram analisadas radiografias panorâmicas, periapicais e prontuários de 250 indivíduos (idade média 6,04 anos, variação 4 a 8 anos, 95 do gênero feminino e 155 masculino) com fissura labiopalatina unilateral completa. O incisivo lateral no lado fissurado estava congenitamente ausente em 30,8% dos casos na dentadura decídua e em 36% dos casos na dentadura permanente, com associação estatisticamente significativa entre as dentaduras ($p = 0,001$). Na dentadura permanente, houve hipodontia do incisivo lateral superior no lado fissurado em 36% dos casos e no lado não fissurado em 7,2%, com associação estatisticamente significativa entre os lados ($p = 0,000$). Nenhum paciente apresentou incisivos laterais supranumerários no lado não fissurado. Foram observados dentes supranumerários em 12,3% dos pacientes na dentadura decídua e 10,66% dos pacientes na dentadura permanente, com associação estatisticamente significativa entre as dentaduras ($p = 0,002$). Estas informações podem permitir melhor aconselhamento dos pais de crianças com fissura labiopalatina, evitando exposições radiográficas desnecessárias em idades precoces.

Palavras-chave: *Incisivo; fissura labial; fissura palatina*