

Tratamento multidisciplinar de diastema interincisivos:

relato de um caso clínico

Cardoso FA, Mendonça MR, Cuoghi OA, Okida RC, Verri ACG, Lelis ER

Faculdade de Odontologia de Araçatuba (FOA/UNESP)

nandacardoso_unesp@hotmail.com

Diastema interincisivo é uma forma comum de distúrbio oclusal caracterizado pelo espaço entre os dentes superiores, e menos freqüente, entre os dentes inferiores. O diastema possui um reflexo determinante na estética, interferindo muitas vezes no convívio social, principalmente em adultos. A etiologia é multifatorial, envolvendo fatores genéticos e ambientais, como frênulo labial proeminente, presença de dentes supranumerários, discrepância dento-óssea positiva e hábitos de sucção não-nutritivos. A literatura mostra uma ocorrência maior em crianças devido o período necessário para erupção dos incisivos laterais permanentes, no entanto este fenômeno pode ocorrer no adulto pela presença de obstáculos que prejudicam o desenvolvimento da oclusão normal. O caso clínico a ser apresentado ilustra uma abordagem terapêutica multidisciplinar em um paciente adulto, portador de um diastema interincisivos causado pela erupção de um dente supranumerário. O objetivo deste trabalho é realizar um diagnóstico preciso do fator etiológico, para elaboração de um plano de tratamento específico individualizado. Com o intuito de melhorar a estética insatisfatória foi realizada a exodontia do dente supranumerário, evidenciando o diastema existente, seguido pelo tratamento ortodôntico e finalização com plástica dental e periodontal. Concluindo, é importante estabelecer as bases de um tratamento adequado, o cirurgião-dentista realizar um diagnóstico preciso do fator determinante que esta causando o diastema, utilizando de forma integrada seus conhecimentos para obter sucesso clínico no caso.