

Relato de caso sobre incisivo superior impactado com dilaceração

Moretto MJ, Lodi CS, Danelon M, Delbem ACB

Faculdade de Odontologia de Araçatuba (FOA/UNESP)

mjmoretto@yahoo.com.br

Dilacerações dentárias referem-se a anomalias caracterizadas por um desvio abrupto em relação ao eixo longitudinal do dente. Uma lesão traumática dos dentes decíduos antecessores e o desenvolvimento ectópico do germe do dente são as causas mais comumente citadas na literatura para esta anomalia. No passado, a extração cirúrgica era a primeira opção de escolha no tratamento de incisivos severamente dilacerados, mas hoje em dia, o diagnóstico precoce e a abordagem interdisciplinar têm permitido um tratamento mais conservador e a manutenção do dente dilacerado no arco dentário em condição funcional e estética. Este trabalho descreve um caso clínico no qual foi realizada a exposição cirúrgica e tração ortodôntica de um incisivo central superior permanente não erupcionado e com dilaceração coronária causada por um traumatismo dentário no antecessor decíduo. Durante a exposição cirúrgica, foi realizada uma pequena perfuração na coroa do dente e fios de aço inoxidável foram inseridos através do orifício e utilizados posteriormente para o tracionamento do dente. A tração do incisivo impactado foi realizada com uma sequência de elásticos ortodônticos e um aparelho removível. O dente foi tracionado com êxito para a uma posição temporária e após a abordagem odontopediátrica, o paciente foi encaminhado para tratamento ortodôntico definitivo para, desta forma, conseguir um posicionamento mais adequado do dente tracionado no arco dentário.