

## **Tratamento cirúrgico da luxação recidivante da ATM: eminectomia - relato de caso**

*Corrêa APS, Fabris ALS, Pastori CM*

*APCD-BAURU*

*paulinha\_odonto@hotmail.com*

A luxação da articulação temporomandibular (ATM) ocorre quando o côndilo move-se para fora da cavidade articular permanecendo posicionado anteriormente a eminência articular, provocando incapacidade de fechar a boca, hipersalivação, dificuldade na fala, tensão nos músculos da mastigação e dores. A eminectomia é uma das modalidades cirúrgicas para tratamento da luxação da ATM, na qual consiste na remoção da eminência articular. O objetivo deste trabalho é através de um relato de caso clínico apresentar a técnica cirúrgica de eminectomia para resolução de luxação recidivante da mandíbula. Paciente T.A.N, feoderma, sexo feminino, 42 anos, compareceu ao serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Associação Hospitalar de Bauru (CTBMF-HB), relatando episódios de luxação mandibular. No exame clínico foi constatado que a mesma apresentava luxação recidivante bilateral. A paciente foi submetida a tratamento cirúrgico de eminectomia bilateral sob anestesia geral. No pós-operatório, foi verificada uma recuperação rápida da paciente e a preservação da função motora do VII par de nervos cranianos. Atualmente a paciente encontra-se com 12 meses de pós-operatório, não sendo observado quadro de recidiva. De acordo com a literatura, pode-se concluir que a técnica de eminectomia permite movimentos mandibulares livres, sendo uma técnica bastante satisfatória e eficaz no tratamento da luxação recidivante.