

Estética imediata com implante cone-morse: relato de caso clínico

Medeiros JAS, Verri FR, Skiba THI, Torcato LB, Falcón-Antenucci RM, Mazaro JVQ

Faculdade de Odontologia de Araçatuba (FOA/UNESP)

joaoantoniomedeiros2004@hotmail.com

A técnica da estética imediata, a qual consiste na instalação imediata do provisório, elimina a necessidade de um segundo estágio cirúrgico e proporciona a cicatrização dos tecidos moles concomitante à osseointegração. O objetivo deste trabalho foi descrever uma reabilitação imediata não funcional com a própria coroa dentária do paciente como provisório, após a instalação de um implante cone morse em região maxilar anterior e demonstrar os benefícios da técnica direta. Caso clínico: O paciente PDS procurou por tratamento reabilitador em uma clínica odontológica particular, em virtude do avulsionamento do elemento 21 por trauma em luta corporal. Após discussão das possibilidades de tratamento com o paciente, foi planejada a instalação de um implante de 4.0x13 mm, cone-morse, sistema Neodent. Devido ao fato de que a textura e a cor da coroa do dente permanente estavam satisfatórias, definiu-se, então, utilizar esta como provisória. A coroa definitiva foi confeccionada após 6 meses, período de osseointegração, no qual o provisório esteve isento de cargas funcionais e parafuncionais. Ao controle de 1 ano, já com a prótese definitiva, foi constatado que a mesma continuava satisfatória e não havia presença de reabsorção óssea ao redor do implante. A técnica da provisionalização imediata com a coroa do dente natural permite uma melhor adaptação dos tecidos moles, pois preserva a gengiva e a papila em estados originais, além de que a utilização da própria coroa do paciente possibilita uma maior aceitação do tratamento realizado por motivos psicológicos.