

Levantamento de sangramento gengival em pacientes assistidos no programa de extensão: higienização bucal do CAO-E-UNESP

*Ribeiro JOB, Souza MMM, Fonte RF, Parisati D, Belizário A,
Lugato ICPT, Brasil RCEA, Louzada LPA*

*Faculdade de Odontologia Araçatuba (FOA/UNESP)
jessica.contato91@hotmail.com*

No Projeto de Higienização Bucal os alunos orientam os pacientes e responsáveis a realizarem a higiene bucal de maneira correta. De acordo com as condições do paciente, grau de compreensão e habilidade motora, são passadas as técnicas mais adequadas à higienização. Observamos várias patologias bucais associadas à má higiene bucal, que apresentam sinais, dentre eles, o sangramento gengival, que atinge a gengiva e o periodonto, podendo trazer prejuízos a tecidos adjacentes. Diversos fatores como, má escovação, falta do uso do fio dental, excesso de força física no momento da escovação, bactérias alojadas e fármacos, têm contribuído para o sangramento gengival. Diante disso realizou-se um levantamento de dados para observar a incidência de sangramento gengival, sob o diagnóstico do cirurgião-dentista. Observou-se se existe sangramento gengival através de uma anamnese realizada com o auxílio de uma ficha clínica pré-existente de cada paciente, focando nas seguintes questões: o uso do fio dental, o número de realizações de escovação durante o dia, se possui sangramento gengival e a maneira como o paciente ou o responsável realiza a higiene bucal. A partir disso, é realizada a higienização bucal, sob a orientação dos alunos. O presente estudo mostrou que os pacientes apresentam sangramento gengival devido ao uso de medicamentos, a falta do fio dental, a má higiene bucal, força excessiva na escovação e até mesmo a presença de patologias. Concluiu-se que a maioria dos pacientes possui sangramento devido principalmente à precária higiene bucal.