

Fechamento de mordida aberta anterior através de ajuste oclusal

Santos JS, Soares AF, Octaviano NC, Mondelli RFL, Mondelli J*

juliete.santos@usp.br

Alguns pacientes com recidiva de mordida aberta anterior na dentição permanente, podem ser tratados com ajuste oclusal, que ajuda a corrigir a mordida aberta, produz rotação anti-horária da mandíbula, melhora a relação maxilomandibular, aumenta a sobremordida e reduz a convexidade facial. O objetivo deste trabalho é apresentar um caso clínico de uma paciente que apresentava um sobrepasso vertical negativo de 2,0 mm na MIH, realizava protrusão e lateralidade apenas com os molares, e já havia sido tratada ortodonticamente, porém sem atingir o fechamento necessário à estética e à oclusão adequada. Desse modo, optou-se por realizar o fechamento da mordida aberta anterior por meio de desgaste e ajuste oclusal modeladores. Depois de verificado os movimentos excursivos e a relação cêntrica, o tratamento iniciou-se com a desprogramação da mordida, seguido pelo emprego dos fios de Roca com diâmetros sequenciais, demarcou-se com carbono os possíveis contatos prematuros em RC. Depois, com marcação obtida em MIH com fita-carbono iniciou-se o desgaste redutor seguindo-se com a remodelação a fim de restabelecer a morfologia e os contatos cênicos pontuais dos dentes posteriores, verificou-se também a protrusão sendo realizada pelos incisivos centrais, garantindo desse modo a chamada oclusão mutuamente protegida e uma estética mais harmônica.

Palavras-chave: *Ajuste oclusal; mordida aberta; oclusão.*