

Restabelecimento estético anterior com resina composta direta

Pereira KF, Tonetto MR, Andrade MF*

kamilafpereira@foar.unesp.br

Devido à grande ocorrência de fraturas na região anterior, a procura por tratamento estético para correção de forma, cor e restabelecimento da função é muito comum ao cirurgião-dentista. Quando estes problemas localizados acontecem devemos considerar a quantia de estrutura dental remanescente, por haver técnicas mais conservadoras e adequadas para restaurá-lo. A técnica direta apresenta-se como uma copia reprodutora fiel aos elementos vizinhos devido a imensa quantidade disponível no mercado de resinas compostas capazes de biomimetizar o tecido dentário. Sequenciando o protocolo clínico de atendimento o propósito deste trabalho foi mostrar de forma simplificada como é possível restabelecer a harmonia estética dos dentes anteriores por meio de resinas compostas diretas, por ser um tratamento eficaz e minimamente invasivo. O profundo conhecimento técnico se faz necessário para utilização da técnica de estratificação natural em diferentes camadas de resina composta. Esta técnica implica num resultado estético bastante satisfatório, não só em termos de cor, mas principalmente na reprodução das propriedades ópticas dos dentes naturais – como translucidez, opacidade e opalescência.

Palavras-chave: *Resinas compostas; estética dental; restauração dentária.*