

Reabilitação oral após perda precoce dos dentes decíduos

Nogueira VKC, Boldieri T, Garotti TP, Pansani CA*

vinciuskcnoguei@foar.unesp.br

A odontopediatria atual está voltada para os procedimentos preventivos, mesmo assim a cárie dentária constitui problema frequente na prática clínica, sendo responsável por destruições coronárias extensas, que por muitas vezes levam a perda de vários elementos dentais; sendo necessários tratamentos reabilitadores diversos. Para solucionar parte desses problemas, o uso de aparelhos protéticos torna-se o tratamento indicado com a finalidade de restaurar a dimensão vertical, a função mastigatória, normalizar a fonação, a estética, e ainda proporcionar um conforto e emocional do paciente. Este estudo relata um caso de reabilitação estético-funcional de um paciente de 09 anos de idade. Foi realizada exodontia precoce dos primeiros molares, caninos, incisivos laterais e incisivo central superiores decíduos, e esse paciente não foi reabilitado, perdendo a dimensão vertical e sofrendo com a discriminação dos colegas devido a sua estética prejudicadas. Para solucionar os problemas encontrados foi realizada uma restauração de Cimento de ionômero de vidro no 2 molar decíduo restante, para que o espaço seja mantido até sua exfoliação natural e após o estudo dos modelos, um aparelho protético foi confeccionado para o paciente, devolvendo sua dimensão vertical e oclusão. O tratamento permitiu restabelecer a função mastigatória, melhorar a fonética e estética da criança, bem como resultou na satisfação, demonstrada pelo paciente e seus familiares.

Palavras-chave: *Reabilitação oral; perda precoce.*