

## **Estudo comparativo entre pacientes expostos e não expostos a fatores de risco para o câncer bucal em campanhas de prevenção do câncer bucal**

***Ohata G\*, Rodrigues BCS, Lima PS, Caetano IK, Massucato EMS, Navarro C, Onofre MA***

*gabrielaohata@foar.unesp.br*

Introdução: Os fatores de risco para câncer de boca são: tabaco, álcool e a exposição crônica aos raios UV. A identificação desses fatores é de grande relevância em atividades que visam a prevenção do câncer bucal. Objetivo: Realizar estudo comparativo entre pacientes que faziam uso do cigarro e do álcool (grupo A) com aqueles que não faziam (grupo B). Métodos: Estudo retrospectivo em um banco de dados (Epi Info versão 3.2.2) composto de 4506 pacientes, ao longo de 13 anos de existência do projeto de extensão “Campanha de Prevenção do Câncer Bucal”, da Faculdade de Odontologia de Araraquara. A amostra foi dividida em dois grupos A e B conforme identificado acima. Resultados: Grupo A contou com 400 pacientes e o B com 2006. No grupo A e no grupo B, os homens representavam 65% e 30% respectivamente. Enquanto as mulheres representaram 34% e 69%. A idade média no grupo A foi 38 anos e no B 34. No grupo A foram encontradas 1501 lesões e no B 7608, ou seja, por volta de 3,7 lesões por paciente. A prevalência de lesões nos grupos A e B foi respectivamente: Queilite Actínica 9,25% e 7,88%; Candidose 5,5% e 5,7%; Leucoplasia 4,5% e 0,5%; Aftas 0,5% e 5,2%. Conclusão: Houve predominância masculina no grupo de risco, bem como maior prevalência de Carcinomas e Leucoplasias. As aftas são menos freqüentes na população exposta ao tabaco.

**Palavras-chave:** *Tabaco; álcool; carcinoma.*