

Abordagem cirúrgica periodontal associada à ortodontia: gingivectomia e gengivoplastia

Terenzi, M.; Sampaio, L.M.

Resumo:

O aumento gengival, também chamado de hiperplasia gengival, pode ser decorrente de diversas etiologias: inflamatórias, medicamentosas, idiopáticas e associadas às doenças sistêmicas. O aparecimento e a manutenção dos aumentos gengivais inflamatórios podem ser contribuídos por alguns fatores locais: presença de cavidades cariosas, apinhamento dental, restaurações com excesso, aparelhos ortodônticos. Vale ressaltar que os aumentos gengivais inflamatórios decorrem de uma resposta tecidual frente a uma exposição prolongada à placa bacteriana, acometendo principalmente a região papilar, podendo distribuir-se de maneira local ou generalizada. Daí, a importância do controle de placa com instrução de higiene oral e tratamento periodontal básico. O uso de cirurgias reparadoras para a solução de doenças gengivais hiperplásicas é antigo, porém, ainda atual, pois promove ótimos resultados desde que corretamente indicado. O caso clínico em questão é de uma hiperplasia gengival inflamatória decorrente do acúmulo de placa no aparelho ortodôntico. O tratamento realizado foi o tratamento básico e instrução de higiene seguidos de uma gingivectomia. O tratamento cirúrgico restabeleceu não somente um contorno anatômico correto e agradável do ponto de vista estético, como também devolveu a possibilidade do paciente conseguir realizar uma adequada higiene.

Palavras-chave: Gingivectomia; gengivoplastia; ortodontia.