

Mesiodens: relato de caso clínico com dois supranumerários

Sedenho, J.F.; Ricci, H.A.; Cerqueira-Leite, J.B.B.

Resumo:

Durante as fases iniciais da formação dentária, os distúrbios de desenvolvimento podem resultar em anomalias, dentre as quais se destacam os dentes supranumerários. Sendo que o mais freqüentemente encontrado na arcada dentária é o mesiodens, situado na linha média da maxila, entre os incisivos centrais superiores. Sua prevalência é maior no sexo masculino e na dentadura mista. Pode ser encontrado de forma isolada ou raramente em pares, apresentar-se erupcionado ou incluso, em posição normal, transversa ou invertido. Os mesmos podem gerar reabsorção radicular do dente adjacente, problemas de oclusão, formação de cistos, neoplasmas, impaction do dente permanente, formação de diastemas, entre outros. Este trabalho tem como objetivo apresentar um caso clínico, no qual o paciente do sexo masculino, 10 anos de idade, compareceu a Clínica de Odontopediatria do Centro Universitário de Araraquara-UNIARA, queixando-se de insatisfação com seu sorriso, sendo motivo de risadas de seus colegas escolares por apresentar vários dentes estranhos, além de desconforto durante a fala e mastigação. Após exame clínico e radiográfico periapical da região, foi diagnosticado a presença de dois dentes supranumerários (mesiodens) já erupcionados. O tratamento consistiu na remoção cirúrgica dos dentes e posterior encaminhamento à Ortodontia para atuar de forma a devolver estética e função adequadas.

Palavras-chave: Dente supranumerário; odontopediatria; cirurgia bucal.