

Técnica de Frenotomia para correção de freio labial superior em odontopediatria

Vieira, P.R.; Fragelli, C.M.B.; Santos-Pinto, L.; Pansani, C.A.

Resumo:

Introdução: A frenectomia ou frenotomia é a cirurgia utilizada na remoção ou reposicionamento do frenulo da língua ou do lábio. Na cirurgia labial ocorre a retirada ou reposicionamento do frênulo labial superior, na intenção de corrigir diastemas ou melhorar a fixação de próteses totais. Na cirurgia lingual, retira-se ou reposiciona o freio da língua, permitindo uma melhor deglutição e melhoria na fala. O método cirúrgico mais utilizado é com o uso de bisturi, porém atualmente estudos mostram uma nova técnica utilizando lasers de CO₂. **Descrição do caso:** Este presente estudo tem como objetivo descrever a técnica de frenotomia realizada em paciente pediátrico BAS, 7 anos, em tratamento ortodôntico. A paciente foi encaminhada para a reinserção do freio labial, devido ao diastema na região dos incisivos centrais. Foi utilizada a técnica de frenotomia, onde não há remoção de tecido, apenas a reinserção do mesmo. O procedimento cirúrgico teve início com a antissepsia extrabucal e intraoral. Em seguida, procedeu-se a aplicação da anestesia e anestesia infiltrativa bilateralmente e por palatino. Para demarcar a incisão, o lábio foi apenas tracionado com auxílio de afastadores bucais. A primeira incisão foi feita com bisturi bilateralmente, no limite entre gengiva inserida e mucosa alveolar até atingir o perióstio até o limite da inserção palatina em formato de cunha. Realizou-se o debridamento, lavagem da ferida cirúrgica e a sutura da mucosa labial com o reposicionamento do freio labial. Após uma semana removeu-se a sutura. **Conclusão:** Na literatura não se encontrou uma idade certa para que a cirurgia fosse realizada, porém em casos de diastemas, o mais correto é realiza-la quando a erupção dos dentes permanentes ocorrer.

Palavras-chave: Frenotomia; labial; crianças.