

A influência da exodontia em reabilitações totais inferiores em carga imediata: estudo clínico

Senko, R.A.G.; Ribeiro-Junior, P.D.; Silva Junior, W. Mendes, G.C.B.; Momesso, N.R.; Saranholi, W.S.

O objetivo deste estudo foi verificar a influência das exodontias realizadas no mesmo momento da instalação dos implantes osteointegrados (IO) na incidência de complicações pós-operatórias. Foram comparados dois grupos de pacientes. Grupo I: Pacientes submetidos instalação de IO para reabilitação oral total de mandíbulas edêntulas. Grupo II: Pacientes submetidos à exodontia e instalação de IO no mesmo momento. Verificou-se uma maior incidência de complicações no grupo II onde foram perdidos 2 IO (2,04%) dos 98 submetidos a carga imediata. No grupo II dos 27 pacientes submetidos ao tratamento reabilitador visando a carga imediata foi conseguido os parâmetros necessários de estabilidade primária em 24 pacientes (88,8%). Já no grupo I dos 14 pacientes tratados 13 (92,8%) foram submetidos a carga imediata. Não houve no grupo I perda de IO instalados em sítios mandibulares cicatrizados submetidos a carga imediata. Foi possível concluir que as extrações realizadas no mesmo momento da instalação dos IO podem contribuir para maior incidência de perda das fixações, e nestes casos foi mais difícil de se atingir a estabilidade primária adequada para aplicação de carga imediata.

Palavras-chave: Implantes dentários; reabilitação bucal; osseointegração.



4º Congresso Odontológico de Araçatuba
34ª Jornada Acadêmica "Prof. Dr. José Eduardo Rodrigues"
10º Simpósio de Pós-Graduação "Prof. Dr. Alcício Rosalino Garcia"
3º Encontro de Técnicos em Laboratório "Rosimeire de Oliveira M. Gon"
6º Encontro do C.A.O.E.

21 a 24 de maio de 2014
Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP

Presidente: Prof. Dr. Fellippo Ramos Verri
Vice-Presidente: Prof. Dr. Marcelo Coelho Goiato

367 resumos apresentados