

Tratamento consevador de queilite actínica

Corado, C.; Solera, L.; Guerra, C.T.; Biasoli, E.R.; Miyahara, G.I.; Bernabé, D.G.

A Queilite actínica é uma lesão cancerizável cuja etiologia está associada a exposição excessiva ao sol. Caso clínico: Paciente de 50 anos, sexo masculino, foi encaminhado à Clínica de Estomatologia da FOA-UNESP, para avaliação de lesão em vermelhão de lábio inferior. À anamnese o paciente referiu que apresentava a lesão no lábio a cerca de 3 meses e exposição crônica ao sol devido seu trabalho de auxiliar de serviços gerais. O exame físico extrabucal revelou presença de lesão ulcerada em vermelhão do labio do lado esquerdo circundada por área erosiva e eritematosa que se estendiam até a região mediana, indolor e limites definidos. Com hipóteses diagnósticas de queilite actínica e carcinoma espinocelular a conduta foi a orientação do paciente quanto medidas preventivas como o uso de chapéu, protetor solar facial e protetor solar labial. Em um acompanhamento de quatro semanas foi notado o desaparecimento total da lesão o que confirmou o diagnóstico clínico de queilite actínica.

Palavras-chave: Queilite; úlcera; tratamento.



4º Congresso Odontológico de Araçatuba
34ª Jornada Acadêmica "Prof. Dr. José Eduardo Rodrigues"
10º Simpósio de Pós-Graduação "Prof. Dr. Alício Rosalino Garcia"
3º Encontro de Técnicos em Laboratório "Rosimeire de Oliveira M. Gon"
6º Encontro do C.A.O.E.

21 a 24 de maio de 2014
Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP

Presidente: Prof. Dr. Fellippo Ramos Verri
Vice-Presidente: Prof. Dr. Marcelo Coelho Goiato

367 resumos apresentados