

## Critérios para tratamento estético em paciente com hipoplasia molar incisivo (MIH)

Maria Júlia Mancim IMBRIANI, Lorena Petrucelli Freire de CARVALHO,  
Tamara Carolina TREVISAN, Matheus Sousa VITÓRIA, Andrea Abi Rached DANTAS,  
Morgana Regina Mendonça de OLIVEIRA, Hermes PRETEL, Osmir Batista de OLIVEIRA JUNIOR

**INSTITUIÇÃO E E-MAIL DO AUTOR APRESENTADOR:** Faculdade de Odontologia de Araraquara - Unesp, Araraquara, SP, Brasil. majumancim@hotmail.com

**RESUMO:** Manchas, alterações de cor e má formação das estruturas dentais, comprometem a estética, dificultam o convívio social e prejudicam a auto estima dos pacientes. O tratamento estético de portadores de hipoplasia molar incisivo é altamente desafiador pois os pacientes apresentam sensibilidade dental exacerbada, dentes com mineralização deficiente, mais escuros e manchados. Nesse relato de caso clínico serão apresentados os critérios para a realização de clareamento e remoção de manchas dentais de paciente adulto jovem portador de MIH. Inicialmente os dentes foram clareados em consultório com peróxido de hidrogênio a 6% contendo nanopartículas de óxido de titânio nitrogenado, foto catalisado com luz violeta, para minimizar o risco de causar sensibilidade dentária e agressão biológica desnecessária. Facetas diretas de resina composta confeccionadas diretamente sobre as manchas dentais complementaram o tratamento estético. Resultados estéticos satisfatórios foram obtidos sem causar sensibilidade dental ou remoção de tecido dentário. Conclusão: o conhecimento das várias técnicas estético/restauradoras e as considerações sobre os riscos, benefícios e limitações de cada técnica são essenciais para tratar os casos de MIH com riscos mínimos.

**DESCRITORES:** Estética Dentária; Clareamento Dental; Hipoplasia do Esmalte.