

Extração de canino incluído: relato de caso

Jessie Madeiros PEREIRA, Luiz Antônio Borelli BARROS, Elcio MARCANTONIO JUNIOR,
Luiz Antônio Borelli BARROS FILHO

INSTITUIÇÃO E E-MAIL DO AUTOR APRESENTADOR: Universidade de Araraquara;
jessiemedeiros560@gmail.com

RESUMO: De fundamental importância na cavidade bucal, o canino além de determinar a chave de oclusão, tem por função dilacerar, rasgar e perfurar os alimentos. Ao longo do tempo, Reis-Centeiro e Marzolla classificaram essa inclusão conforme a disposição do dente no arco, posicionando assim, pré-alveolar, trans-alveolar, alveolar e retroalveolar. Entre as condições locais dessa impação temos: anquilose dos decíduos, mudança do posicionamento dos dentes permanentes devido a falta de tratamento conservador dos temporários, condensação óssea que limita o movimento de erupção, fibromucosa espessa e carência de crescimentos dos maxilares relacionado ao tamanho dos dentes (coros/raiz). Esse trabalho tem por objetivo mostrar através de relato de caso clínico, as etapas do procedimento de extração de um canino incluído. A paciente C.A, sexo feminino, 43 anos de idade, compareceu para remoção do canino incluído. O elemento 23 encontrava-se na posição trans-alveolar, muito próximo a raiz do dente 24, junto ao soalho da cavidade nasal e seio maxilar. O procedimento foi realizado sob anestesia local. A incisão realizada foi a trapezoidal e a osteotomia com a broca nº 2 em baixa rotação. A coroa foi seccionada com broca 702 em alta rotação, mediante abundante irrigação com soro fisiológico. Pontos simples foram utilizados e a sutura finalizada. Concluímos que a TC se tornou ferramenta fundamental para diagnóstico e auxílio no plano de tratamento dos pacientes, facilitando a execução cirúrgica. Esta nos mostra a exata posição e o envolvimento com as estruturas nobres do sistema estomatognático.

DESCRIPTORIOS: Anquilose Dental; Dente Incluído; Osteotomia.