

A intensidade do infiltrado inflamatório em leucoplasia verrucosa proliferativa

Mariel BIANCARDI, Darcy FERNANDES, Heitor Albergoni da SILVEIRA, Esteban Alexis ARROYO, Camila Oliveira BARBEIRO, Jorge Esquiche LEÓN, Andreia BUFALINO

INSTITUIÇÃO E E-MAIL DO AUTOR APRESENTADOR: Faculdade de Odontologia de Araraquara - Unesp; mariel.biancardi@gmail.com

RESUMO: A Leucoplasia Verrucosa Proliferativa (LVP) pode ser difícil de diagnosticar nos estágios iniciais falta de recursos específicos. Nosso objetivo foi comparar características clinicopatológicas e a intensidade inflamatória entre LVP e leucoplasia oral (LO). Os dados clínicos foram coletados retrospectivamente dos arquivos do Serviço de Medicina Bucal/FOAr. A intensidade do infiltrado inflamatório foi comparada entre os grupos com diagnóstico de LVP e leucoplasia oral (LO). A intensidade do infiltrado inflamatório foi mostrada em quartis: ausência de inflamação, 0 células (Q1); inflamação leve, 69 células (Q2); inflamação moderada, > 69 até 148 células (Q3); inflamação grave, >149 células (Q4). A análise univariada mostrou associação significativa de LVP com graus mais elevados de displasia, maior intensidade na presença de infiltrado inflamatório (Q3 + Q4) e recidiva. Uma correlação positiva foi observada entre a LVP e a intensidade do infiltrado inflamatório, alto grau de displasia, recorrência e taxa de transformação maligna. A presença de denso infiltrado inflamatório nas fases clínicas iniciais da LVP parece ser uma característica diferencial para a LO e indica uma resposta imune em curso no desenvolvimento desta doença.

DESCRIPTORIOS: Leucoplasia Verrucosa Proliferativa; Infiltrado Inflamatório; Leucoplasia.