

## Condilectomia baixa para tratamento de osteocondroma na cabeçada mandíbula – relato de caso

Abel Jara DE SOUZA, Mateus Fiuza SANTOS, Luis Gustavo Jaime PAIVA

O osteocondroma é o tumor benigno mais comum do esqueleto axial, no entanto é considerado uma lesão rara no esqueleto maxilofacial. As áreas acometidas com mais frequência no esqueleto maxilo-facial são o processo coronóide e a cabeça da mandíbula. Como tratamento é realizado a remoção total do tumor, utilizando como técnica a condilectomia baixa e condilectomia total. Esse trabalho tem o objetivo de apresentar um relato de caso no qual foi realizada a excisão completa de um osteocondroma da cabeça da mandíbula pela técnica da condilectomia baixa. Paciente masculino, relata dificuldade de abrir a boca, dor em região pré-auricular e crepitação. Ao exame imaginológico na tomografia computadorizada constatou-se massa óssea lobulada na região da cabeça da mandíbula do lado esquerdo. No exame clínico observou-se leve assimetria facial com desvio mandibular. Após os achados optou-se pela remoção total do tumor. Sob anestesia geral, foi realizada a remoção completa do tumor pela técnica da condilectomia baixa, ancoragem do disco articular e osteotomia sagital do ramo mandibular ipsilateral. A técnica da condilectomia total mostrou-se eficiente na remoção do tumor, juntamente com a osteotomia sagital do ramo mandibular ipsilateral, reestabelecendo altura facial e oclusão adequada.

**DESCRITORES:** Cabeça da mandíbula; Osteocondroma; Articulação temporomandibular