

Neoplasia mesenquimal benigna frequente em cavidade oral

Renan Lemos da SILVA, Caroline Liberato MARCHIOLLI, Lara Gimenez BAZAN,
Luciana Estevam Simonato de OLIVEIRA

O fibroma é uma neoplasia mesenquimal benigna de origem do tecido conjuntivo, sendo classificado como a lesão mais comum da cavidade oral. Sua etiologia pode estar relacionada com irritações crônicas de baixa intensidade. Clinicamente, apresenta-se como uma lesão nodular, normocrômica, de base pediculada ou séssil, superfície lisa, tamanho variável, indolor e fibroso a palpação. Muitas vezes atrapalha na fonação ou mastigação do paciente, quando atinge grandes proporções. O fibroma é mais comum entre os 30 e 60 anos de vida, sendo frequente em ambos os sexos. Seu tratamento de eleição é excisão cirúrgica. O objetivo desse trabalho foi relatar um caso de neoplasia mesenquimal benigna mais frequente em cavidade oral, o fibroma. Paciente do sexo feminino, 52 anos de idade, compareceu a Clínica Odontológica da Universidade Brasil - Campus Fernandópolis, queixando-se de “desconforto na bochecha causado por uma bolinha”. Ao exame físico intrabucal verificou-se um nódulo normocrômico localizado em mucosa jugal do lado esquerdo medindo cerca de 1 cm, séssil, superfície lisa e indolor. O diagnóstico clínico foi de fibroma e a primeira conduta foi a biopsia excisional com encaminhamento do material para análise histopatológica, que confirmou o diagnóstico. A paciente retornou a clínica sete dias após a cirurgia e ferida estava totalmente cicatrizada. Diante do caso apresentado, pode-se concluir que o fibroma apesar de ser a neoplasia mesenquimal benigna mais frequente em cavidade oral não requer tratamento em todos os casos. A excisão cirúrgica é necessária quando a lesão causa prejuízo funcional ao paciente, seja fonético, estético e/ou mastigatório.

DESCRITORES: Fibroma; estomatologia; neoplasia benigna.