

Remoção cirúrgica de tórus mandibular bilateral: relato de caso e considerações clínicas

Dayane MAZZOCHIN, Daniele MAZZOCHIN, Tiago Gai AITA

Introdução: o tórus são exostoses ósseas nos ossos gnáticos, com etiologia multifatorial, podendo estar relacionado à hábitos parafuncionais mastigatórios. Esses crescimentos ósseos benignos evoluem lentamente e podem causar dificuldades com adaptação de próteses, necessitando remoção cirúrgica. **Objetivo:** documentar a remoção cirúrgica de tórus mandibular bilateral, fornecendo informações sobre a abordagem e considerações clínicas. **Conduta clínica:** paciente do sexo masculino, 61 anos, procurou a Clínica Odontológica da Universidade Cesumar de Londrina, em busca de reabilitação protética. O exame físico intraoral revelou presença de edentulismo parcial, na arcada inferior, desgaste dentário, bem como presença de tórus mandibular bilateralmente. Em anamnese o paciente relatou ter hábito parafuncional mastigatório. Foi realizada radiografia oclusal da mandíbula. Optou-se então pela realização de cirurgia para excisão do tórus mandibular. Foi realizado bloqueio regional bilateral, confecção de retalho envelope, descolamento mucoperiosteal, osteotomia com sulcos de orientação e clivagem dos blocos ósseos, regularização do rebordo e irrigação abundante seguida de sutura interpapilar. Após a cirurgia o paciente recebeu as recomendações pós operatórias e prescrição medicamentosa. A sutura foi removida depois de 7 dias e após 1 mês a mucosa apresentava-se bem regenerada. O paciente então foi encaminhado para a reabilitação protética. **Resultados:** a remoção do tórus nem sempre é indicada, sendo mais comum em casos que requerem tratamento protético. Alguns estudos indicam uma associação entre hábitos parafuncionais mastigatórios, com o aumento da probabilidade de desenvolvimento de tórus mandibulares. **Conclusão:** Em suma, a remoção seletiva do tórus mandibular mostrou-se benéfica, especialmente em situações que demandam reabilitação protética. Ademais a relação entre hábitos mastigatórios parafuncionais e tórus mandibulares evidencia a necessidade de investigações mais detalhadas.

DESCRITORES: Reabilitação; cirurgia bucal; bruxismo.