Odontoma complexo gigante: relato de um caso do diagnóstico ao tratamento

Carolina dos Santos Padula RUPEREZ, Denis ZANGRANDO, Michele Silva de OLIVEIRA, Maurício Flaminio AMATO, Andréia BUFALINO, Cláudia Maria NAVARRO, Elaine Maria Sgavioli MASSUCATO, Túlio Morandin FERRISSE

Introdução: Os odontomas são considerados hamartomas odontogênicos com etiologia desconhecida, subdivididos em complexos e compostos. Os primeiros, formam aglomerados de tecidos de origem dentária desorganizados, mais comuns na mandíbula posterior. Já os odontomas compostos são constituídos por vários dentículos, acometendo preferencialmente a região anterior da mandíbula e maxila. Geralmente assintomáticos, identificados em radiografias de rotina como lesões com estrutura interna radiopaca e borda radiolúcida. Raramente atingem grandes proporções que causem expansão óssea e deformidade facial. O tratamento é cirúrgico com bom prognóstico e baixo risco de recorrência. **Objetivo:** relatar um caso de odontoma complexo gigante, enfatizando as características clínicas, radiográficas e tratamento. Paciente de 09 anos de idade, leucoderma, sexo masculino, ASA 2, com diabetes tipo 1, encaminhado por não ter erupcionado o dente 46. Clinicamente, apenas alterações no exame intraoral, com expansão da cortical óssea vestibular, em região do dente 46, dura à palpação e indolor. **Conduta clínica:** solicitada radiografia panorâmica que revelou uma lesão heterogeneamente radiopaca circundada por halo radiolúcido, deslocando o dente 46 apicalmente em direção à base da mandíbula. A tomografia computadorizada confirmou as características da imagem panorâmica, revelando uma lesão hiperdensa circundada por halo hipodenso causando a expansão das corticais vestibular e lingual. As hipóteses diagnósticas foram de odontoma complexo, fibro-odontoma ameloblástico e tumor odontogênico epitelial calcificante. A lesão foi enucleada sob anestesia geral, preservando o nervo alveolar inferior direito. **Resultados:** a hipótese de odontoma complexo foi confirmada. **Conclusão:** importante sempre se investigar a ausência de dentes por meio de radiografias, para o correto diagnóstico e tratamento adequado. Neste contexto, os odontomas são considerados uma das principais causas que levam à alteração na erupção dos dentes.

DESCRITORES: Anormalidades dentárias; tumores odontogênicos; neoplasias mandibulares.