

Variáveis associadas a sinais e sintomas sugestivos de disfunção temporomandibular em gestantes: estudo transversal

Julia Gabriela GIRASOL, Lais DORIGHELLO, Mariana de MATOS, Fernanda Lopez ROSELL, Aylton VALSECKI Jr., Daniela Aparecida de Godoi GONÇALVES, Vanessa PARDI, Elaine Pereira da Silva TAGLIAFERRO

Introdução: A Disfunção Temporomandibular (DTM) é uma condição multifatorial, caracterizada por dor orofacial, ruídos articulares e limitações mandibulares, com possível influência de fatores hormonais, emocionais e comportamentais, especialmente durante a gestação. **Objetivo:** Assim, o objetivo deste estudo (CAAE 61525116.2.0000.5416) foi analisar as variáveis associadas a sinais/sintomas sugestivos de DTM relatados por gestantes atendidas na Faculdade de Odontologia de Araraquara (FOAr/UNESP). **Método:** A coleta de dados foi realizada por meio da análise de prontuários odontológicos de pacientes gestantes (n=257), atendidas entre 2009 e 2016 na FOAr. Os sinais/sintomas sugestivos de DTM foram registrados a partir de questões baseadas no Índice Anamnésico de Fonseca et al. Os dados foram analisados de forma descritiva e por testes de Qui-quadrado ou Exato de Fisher, adotando-se nível de significância de 5%. **Resultado:** Observou-se associação estatisticamente significativa entre a presença de sinais/sintomas sugestivos de DTM e o relato de dor de dente ($p = 0,0044$), apertamento ou bruxismo ($p = 0,0226$), dor de cabeça ($p = 0,0001$) e dor na nuca ou torcicolo ($p = 0,0004$). **Conclusão:** Conclui-se que os sinais e sintomas sugestivos de DTM relatados por gestantes estiveram significativamente associados à presença de dor e ao hábito de apertar ou ranger os dentes.

DESCRITORES: Saúde bucal; gestantes; articulação temporomandibular.