

Lesão nodular em mucosa labial: a importância do diagnóstico diferencial em lesões bucais comuns

Hugo Sobrinho BUENO, Luciana Estevam SIMONATO

Introdução: As lesões nodulares da mucosa bucal, apesar de frequentemente benignas, exigem atenção clínica para um diagnóstico diferencial adequado, a fim de evitar subestimação de lesões de origem neoplásica. **Objetivo:** Este trabalho relata um caso de lesão nodular em mucosa labial com características clínicas sugestivas de fibroma, ressaltando a importância do exame clínico minucioso e da confirmação histopatológica. **Conduta clínica:** Com a devida autorização da paciente por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), relata-se o caso de uma paciente do sexo feminino, leucoderma, 50 anos, usuária de AAS, sem outros hábitos ou comorbidades, foi atendida no Centro de Especialidades Odontológicas de Fernandópolis/SP com queixa de “bolinha na boca”. Ao exame extrabucal, nenhum achado digno de nota foi observado. No exame intrabucal, identificou-se nódulo único, normocrômico, de base sésil, superfície lisa, arredondado, medindo aproximadamente 1,5 cm, indolor e de consistência fibrosa, localizado em mucosa labial inferior. Foi realizada biópsia excisional, e o exame histopatológico confirmou o diagnóstico de fibroma. **Resultado:** O acompanhamento clínico demonstrou boa cicatrização, sem sinais de recidiva após o procedimento. Embora o fibroma seja uma lesão benigna e de alta frequência, a avaliação clínica criteriosa, seguida de confirmação anatomopatológica, é fundamental para descartar outras lesões de apresentação semelhante. **Conclusão:** O caso evidencia a importância do diagnóstico diferencial em lesões bucais comuns e do encaminhamento adequado, mesmo em situações consideradas triviais.

DESCRIPTORIOS: Fibroma; mucosa bucal; diagnóstico diferencial.