

A importância do acompanhamento odontológico para a detecção da agenesia dentária

Júlia Contessotto de ARAÚJO, Ricardo Otero Furlan MARIANO JUNIOR, Cláudio Alberto FRANZIN, Sandra de Oliveira TORCHI, Suzimara Géa OSÓRIO, Francismar Zamberlan RAUSCH, Ilma Carla de SOUZA, Lucimara Cheles da Silva FRANZIN

Introdução: A agenesia dentária é uma anomalia de número bastante comum. Os incisivos laterais são os dentes prevalentes mais acometidos, no entanto, esta alteração pode acometer terceiros molares e pré molares. A ausência dos incisivos laterais acarreta em um grave problema estético e psicológico, além de contribuir para a instalação de uma má oclusão. **Objetivo:** Este estudo tem por objetivo relatar o diagnóstico, planejamento e tratamento de um caso clínico de agenesia dentária. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética local (número: 52279321.9.0000.5220). **Conduta clínica:** Paciente do sexo masculino, 18 anos de idade, procurou atendimento odontológico queixando-se de diastemas e da aparência do seu sorriso. Ao exame clínico e radiográfico (radiografia periapical e panorâmica), constatou-se a ausência dos incisivos laterais (12 e 22), confirmando o diagnóstico de agenesia dentária. **Resultado:** De acordo com a classificação da oclusão do paciente, planejou-se o tratamento ortodôntico para abertura de espaço e restabelecimento, das guias e chaves de oclusão, associando futuramente a instalação de implante na região dos incisivos laterais e reabilitação. **Conclusão:** Em casos de anomalias de número, é relevante o exame clínico e radiográfico para um diagnóstico precoce. Além de uma atuação multidisciplinar, dada a gravidade dos problemas na oclusão e na estética acarretados pela falta de um elemento dentário.

DESCRIPTORES: Anodontia; anormalidades dentárias; ortodontia.