

Síndrome do envelhecimento bucal precoce: a urgência de compreender os sinais clínicos em adultos jovens brasileiros e canadenses

Ana Carolina REIS, Laysa Cristina Lucas de OLIVEIRA, Letícia Silva CARNEIRO, Lísia Aparecida Costa GONÇALVES, Felipe Fornias SPERANDIO, Marina Lara de CARLI

Introdução: A recessão gengival (RG) é caracterizada pela migração apical da margem gengival, provocando exposição da raiz e perda de inserção. Já a hipersensibilidade dentinária (HD) é definida como uma dor aguda e de curta duração, causada pela exposição da dentina na cavidade bucal. Ambas as condições apresentam alta taxa de prevalência na população e impactam, diretamente, na qualidade de vida e na saúde geral dos indivíduos. No entanto, os fatores etiológicos dessas condições ainda não foram bem estabelecidos. **Objetivo:** Dessa maneira, o objetivo do presente trabalho é avaliar a incidência de RG e a dor provocada por HD entre adultos jovens em atendimento na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG) e avaliar os fatores contribuintes para o desenvolvimento dessas alterações. **Método:** A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética (CAAE: 78097124.8.0000.5142). Para a avaliação da recessão gengival, utilizou-se a classificação de Cairo e para a identificação da dor provocada por hipersensibilidade dentinária foi utilizado o Questionário de Experiência Hipersensibilidade Dentinária (DHEQ-15). **Resultado:** A pesquisa está em andamento e até o presente momento, foram atendidos 8 pacientes sendo 7 mulheres e 1 homem. Dentre eles, todos apresentaram recessão gengival tipo I de Cairo (RT1), 4 (50%) declararam ter hipersensibilidade dentinária, 5 (62,5%) fizeram o uso de aparelho ortodôntico, 1 (12,5%) relata sensibilidade dolorosa na gengiva, 4 (50%) escovam os dentes apenas 1 vez ao dia e 5 (62,5%) usam o fio dental apenas 1 vez ao dia. Quanto ao biótipo gengival, 6 (75%) apresentam o tipo fino e ausência de sangramento à sondagem. Dentre as mulheres, apenas 2 (25%) não fazem o uso de anticoncepcional. Em relação ao DHEQ-15, a maior parte dos participantes declarou ter qualidade de vida. **Conclusão:** Os resultados parciais sugerem uma associação entre recessão gengival, hipersensibilidade dentinária e uso de aparelho ortodôntico, embora a amostra apresente-se pequena até o presente momento.

DESCRITORES: Retração gengival; sensibilidade da dentina; adulto jovem.