

Restauração direta em incisivos centrais superiores com hipomineralização molar incisivo (HMI): relato de caso

Maria Geovanna Costelini de MATOS, Elisiee Lima LACHI, Márcio Grama HOEPPNER

Introdução: A Hipomineralização Molar-Incisivo (HMI) é um defeito qualitativo do esmalte que acomete os primeiros molares e, frequentemente, também os incisivos permanentes. Os dentes comprometidos podem apresentar coloração branca a castanho-amarelada e exposição dentinária, nos casos mais severos. As alterações clínicas podem gerar impacto estético, funcional e/ou psicossocial. **Objetivo:** O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de reabilitação estética de incisivos centrais superiores afetados por HMI, utilizando resina composta. **Conduta clínica:** Paciente do sexo masculino, 6 anos, foi encaminhado para a Universidade Estadual de Londrina (UEL) para tratamento restaurador dos incisivos centrais superiores. Durante a anamnese, os responsáveis legais pelo paciente relataram histórico de queda, por volta dos 12 meses, na qual o paciente traumatizou os elementos superiores decíduos. Na época, buscaram atendimento, mas não foram observadas alterações clínicas ou radiográficas importantes. Entretanto, quando os elementos 11 e 21 começaram a irromper, os responsáveis observaram que a borda incisal estava de cor amarelada, motivando a busca do atendimento odontológico. Além disso, também foi relatado que o paciente apresentava sintomas de sensibilidade e dor ao consumir alimentos doces e gelados. Ao exame físico intraoral, foi diagnosticado Hipoplasia Molar Incisivo (HMI), envolvendo o terço médio e incisal. Após assinatura do TCLE, pelos responsáveis legais do paciente, foram realizadas restaurações diretas com resina composta. **Conclusão:** No acompanhamento clínico de 24 meses, foi observado que o tratamento restaurador permanece funcional e estético, sem comprometimento de adesão e retorno da sintomatologia. O tratamento de HMI, utilizando protocolo minimamente invasivo com resina composta e respeitando os princípios de adesão aos substratos dentários, mostrou-se eficaz na reabilitação estética e funcional dos dentes com HMI.

DESCRIPTORIOS: Hipomineralização molar; defeitos de desenvolvimento; defeitos de desenvolvimento do esmalte.