

Avaliação clínica precoce como fator determinante para a recuperação do espaço na dentição mista

Clara Valério CHUNG, Heloisa Siviero CAPELOZA, Tatiana Giachini CAMARGO,
Fernanda Vicioni MARQUES

Introdução: A perda precoce de dentes decíduos pode comprometer o desenvolvimento da oclusão, especialmente quando não há intervenção imediata para a manutenção do espaço. **Objetivo:** Relatar a importância da avaliação clínica precoce e da conduta ortodôntica interceptora para a recuperação do espaço na arcada superior de paciente em dentição mista. **Conduta clínica:** Paciente do sexo masculino, 7 anos e 3 meses, foi encaminhado à clínica ortodôntica com histórico de exodontia do dente 64, realizada sem a adoção de medidas para preservação do espaço. Durante o exame clínico, observou-se perda do espaço para erupção do dente 24. Optou-se pela instalação de aparelho ortodôntico recuperador de espaço com mola dupla helicoidal, associado à verticalização do dente 26. O tratamento teve duração de nove meses, incluindo o período de contenção. **Resultado:** Com o uso contínuo do aparelho e acompanhamento clínico, foi possível restabelecer o espaço adequado, favorecendo o irrompimento do primeiro pré-molar superior esquerdo. **Conclusão:** A conduta preventiva e a intervenção oportuna em casos de perda precoce de dentes decíduos são essenciais para garantir o desenvolvimento adequado da oclusão. O caso reforça o papel da avaliação clínica cuidadosa na infância como ferramenta decisiva para tratamentos ortodônticos simples e eficazes. TCLE assinado pelo paciente.

DESCRIPTORIOS: Dentição mista; ortodontia preventiva; espaço interdental.